FICHA TÉCNICA

frilex 125 ec

TIPO DE FORMULACIÓN: EC (Concentrado Emulsionable)
USO: FUNGICIDA

INGREDIENTE ACTIVO:

Furalaxyl M 125 g/l Nombre IUPAC: methyl N-(2-furoyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate No. CAS 57764-08-6

EMPRESA FORMULADORA: Ipesa S.A.
Argentina

TITULAR DEL REGISTRO:

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

INTEROC CUSTER

Autopista Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13
Cota – Colombia
Telf: 8415771 - 8415055

REGISTRO NACIONAL ICA No. 734

MODO DE ACCIÓN:

FRILEX es un fungicida de contacto y sistémico. Es absorbido a través de las raíces, tallos y hojas rápidamente. Es traslocado acropetalmente (en sentido ascendente) a través del xilema de las plantas.

Detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la síntesis de proteínas, más específicamente inhibiendo el ácido ribonucleico. Actúa impidiendo el crecimiento subcuticular de las hifas del patógeno en los tejidos afectados de la planta, por lo que su acción primordial se califica como curativa.

Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Bogotá D.C. – Colombia

USO AGRÍCOLA

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	P.C	P.R
Rosa (*Rosa sp*.)	*Peronospora sparsa* (Mildeo velloso)	2 cc/l ó 3 l/ha	N.A	24 horas
Tomate (Lycopersicum sculentum)	*Phytopthora infestans (Gota o tizón Tardio)*	1.0 a 1.5 cc/l dependiendo de los niveles de infestación	7 días	12 horas

P.C: Período de carência: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y La cosecha.
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

MODO DE EMPLEO:

FRILEX se aplica cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad. Puede aplicarse cada 7 días con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda rotar con productos de diferente modo de acción.
Para preparar el caldo de aspersión, agite el envase antes de dosificar. Diluya la cantidad recomendada de FRILEX en un recipiente aparte con un poco de agua hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar esta premezcla en la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie que pretende proteger. Agite constantemente y úselo de inmediato. No guardar.

COMPATIBILIDAD:

No se recomienda mezclar con otros productos por problemas de incompatibilidad que puedan presentarse. En caso de necesidad de estas mezclas, se recomienda realizar primero pruebas sobre un pequeño número de plantas y evaluar tanto la efectividad como los problemas de manchado o pérdida de calidad de planta, antes de hacerlo a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

PRECAUCIONES:
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar FRILEX, en la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en horas tempranas.
Evite contaminar con FRILEX las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

100 cc, 125 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 1 litro, 5 litros, 200 litros.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Bogotá D.C. – Colombia

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.